

带状疱疹ワクチン 一覧

	弱毒生水痘ワクチン（ビケン）	シングリックス
ワクチンの種類	生ワクチン	不活化ワクチン
発症予防効果	51.30%	50歳以上 97.2% 70歳以上 91.3~97.9%
神経痛予防効果	66.50%	88.80%
長期予防効果	8~10年で効果消失	8年で84.0%の有効率
副反応	・発赤、腫脹、疼痛などの局所反応が5%以上	・局所反応（74.1%）：疼痛、発赤、腫脹 ・全身反応（43.8%）：筋肉痛、疲労、頭痛 など
受けてはいけない方	・発熱している方 ・重篤な急性疾患にかかっている方 ・妊婦 ・免疫を抑える治療を受けている方 ・免疫機能異常のある疾患を有する方 など	・発熱している方 ・重篤な急性疾患にかかっている方 ・本剤にアナフィラキシーのある方など
注意事項	・妊娠可能な婦人においては、 接種前約1か月間と接種後2か月の避妊 ・摂取当日は過度な運動は避ける	・摂取当日は過度な運動は避ける
接種回数	1回	2回（2か月間隔） ※2か月を超えた場合でも6か月以内に接種すること
接種方法	皮下注射	筋肉注射
費用	8,800円（税込）	合計44,000円（税込） 《 22,000円（税込） × 2回 》
対象者	50歳以上	50歳以上